

El incumplimiento terapéutico en atención domiciliaria paliativa (Pades)

Sra I. Serralonga ,Sr C. Carrasquer ,Sra Carmen Rodriguez ,Sra B .Madueño ,Sra E. Saez ,Sra F. Aguilar Sra P .Romero

INTRODUCCIÓN

En nuestra práctica diaria en los equipos domiciliarios de atención en cuidados paliativos, vamos a analizar la tasa de incumplimiento terapéutico

OBJETIVOS


Describir casos de incumplimiento terapéutico en el período comprendido desde enero a diciembre del 2017, discriminando tipo de fármaco, perfil del incumplidor y si existe abandono o no tras el inicio del tratamiento.

METODOLOGÍA

Estudio retrospectivo, descriptivo, observacional, cuantitativo. El promedio de los pacientes prevalentes seguidos por los 9 equipos de atención domiciliaria fueron de 514 pacientes. Mediante la revisión y análisis de cursos clínicos, evolutivos y tratamientos farmacológicos entre el 01/01/2017 y 31/12/2017. Para la Extracción de los datos se ha utilizado un programa interno "Aegerus" donde se registran todos los datos socio-demográficos de todos los pacientes atendidos, recogidos durante las visitas domiciliarias llamadas telefónicas por parte del paciente/familia a su equipo, seguimiento telefónico del propio equipo, comprobación PIIC / PDA

CONCLUSIÓN

A nivel global, en un (72,68%) de las ocasiones, se produce un abandono del fármaco y en un (27,32%) un no-inicio del mismo. La mayoría de causas por incumplimiento (58,2%) no quedan explicadas en el curso clínico. El causante más frecuente en el incumplimiento del uso de benzodiacepinas/neurolepticos (32,10%), espesantes (21,14%), laxantes (16,26%) aines (7,2%) es un familiar-Cuidador. En el incumplimiento del uso de opioides es más frecuente que el causante sea el paciente (23.3%)



INCUMPLIMIENTOS MAS FRECUENTES

